

# 家畜衛生だより

令和4年3月発行  
最上家畜保健衛生所  
最上地域家畜畜産物衛生指導協会  
Tel: 29-1357 Fax: 23-2944

## 再度、豚熱防疫対策の徹底をお願いします!!

野生イノシシ生息地域への入山者の増加、融雪等による野生イノシシの行動範囲の拡大などから、これから春を迎えるにあたり野生イノシシの保有する豚熱ウイルスが拡散される可能性が高まることが予測されます。昨年は、1月及び3月に飼養豚での豚熱が各1事例発生した後、4月に4事例発生するなど春に発生が集中しました。

また、豚熱のこれまでの疫学調査で、免疫を獲得していない豚群のいる離乳豚舎で特に感染がおこりやすいことを念頭において、豚舎に出入りする際にウイルスを持ち込まない衛生対策を実施することが必要です。

以下の豚熱の防疫対策を徹底し、発生を予防しましょう！

### ① 病原体持ち込み防止の徹底

- ◇ 関係者以外の農場への立入禁止
- ◇ **車両、物、畜舎周囲の消毒**
- ◇ 長靴、衣服の**交換、消毒の徹底**
- ◇ 農場入退場時の**手指の消毒**



関係者以外の農場への立入を禁止



農場(畜舎)に出入りする際には、消毒を実施


### ② 野生動物の侵入防止対策

- ◇ **野生動物の農場への侵入防止対策の徹底**  
(例)



← 農場周辺に柵を設置

堆肥舎等への防鳥ネット設置→



裏面へ続く

### ③毎日の健康観察、早期発見・通報

◇飼養家畜を毎日観察し、家畜に異常がみられた場合は、**すぐに家畜保健衛生所に連絡**

#### 豚熱（CSF）の症状

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等  
**異状を発見したら直ちに通報しましょう!**



写真出典:岐阜県

#### アフリカ豚熱（ASF）の症状



病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱（40～42℃）、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典:国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

《家畜に異常が見られた場合の連絡先はこちら》

**最上家畜保健衛生所**

**電話 0233-29-1357**（休日、夜間も対応）