

# 家畜衛生だより

R5-10 令和5年6月 発行

置賜家畜保健衛生所  
置賜家畜衛生指導協会  
〒999-2232 南陽市三間通 444  
TEL 0238-43-3217  
FAX 0238-43-5249

## サシバエ対策をしましょう！！

サシバエは秋口に多くなるイメージがありますが、その発生は春から始まっています。サシバエはストレスや痛みの原因となる他、牛伝染性リンパ腫(牛白血病)などの感染症を媒介することでも知られています。早速対策を始めましょう。

### サシバエの特徴

- ◆**飛行能力が高く** (約 4 k m も飛べる!)、**雌雄ともに針状の口で吸血**し、牛及び人へ危害を及ぼす。
- ◆牛舎近くに生息し、**発生源は少し古めの糞**。
- ◆**卵から 2 週間程度で成虫**になり、その後 2～3 か月程度生きる。
- ◆**生涯 800 個近く産卵**、**繁殖性が高い**。
- ◆**サナギは越冬**する。



イエバエよりも  
小さい

### サシバエによる被害

- ◆サシバエが増えると、牛は立ったまま尻尾を振り回し、皮膚を震わせて痛さと戦わなくてはなりません。
- ◆そのため、落ち着いて横になれず、反芻も出来ません。
- ◆**食い込みが落ちる、増体が落ちる、乳量が落ちる、発育停滞を起こす** 等々



**被害は予想以上に大きい！！**

皆さんの牛舎を見渡してみてください

○牛が**横になれず、立ったまま**ではないですか？

○牛が**尻尾をぶんぶん振って**いませんか？

○牛が**牛舎の隅に固まっ**ていませんか？

**すでにサシバエの被害が出始めているのかも**

# 対策で重要なのは発生源対策と幼虫対策

## 発生源対策：サシバエの住みにくい環境を作る！！

- ♣こまめな除糞、堆肥化
- ♣こぼれた餌の掃除、水漏れ箇所を直す

## 幼虫対策：移動の少ないウジのうちに対策を！！

- ♣昆虫成長抑制剤（IGR 剤）等の散布
  - ・毎月最低 2 回は散布
  - ・畜舎周辺やバークリーナー上、堆肥場等へ

●●さらにとどめの成虫対策●●

市販の粘着シートの設置  
防虫ネットの設置  
畜舎周辺の草刈り



さなぎ；乾いた場所  
例) 空き牛舎  
ません棒の下等



細長く先が尖る



ご飯粒より小さく赤い



ウジ；湿った場所  
例) 飼槽の隅っこ  
ウォーターカップ下  
ゴムマットの下等

ご不明な点は家畜保健衛生所へ

ご相談ください♪

TEL:0238-43-3217